

4 Übungen zu Grundlagen der induktiven Statistik

Zoltán Zomotor

Versionsstand: 30. März 2016, 10:11



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/> or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Aufgabe 1: Reviewfragen

- (a) Was ist der Unterschied zwischen deskriptiver und induktiver Statistik?
- (b) Was versteht man unter einer *einfachen Stichprobe*?
- (c) Welchen Wert nimmt die Varianz des Stichprobenmittels $\text{Var}(\bar{X})$ für eine einfache Stichprobe X_1, \dots, X_n mit beliebiger Verteilung und $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ an, wenn $n \rightarrow \infty$?
- (d) Was ist die Likelihoodfunktion $f(x_1, \dots, x_n | \vartheta)$?
- (e) Wie wird die Likelihoodfunktion $f(x_1, \dots, x_n | \vartheta)$ bei einer einfachen Stichprobe X_1, \dots, X_n bestimmt? Was bedeutet hier ϑ ? Geben Sie ein Beispiel für ϑ .
- (f) Unter welcher Voraussetzung für die einfache Stichprobe X_1, \dots, X_n gilt für ihre Stichprobenvarianz

$$\frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)?$$

Welchen Wert haben unter dieser Voraussetzung Erwartungswert und Varianz $E(T)$ und $\text{Var}(T)$ mit

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}?$$

- (g) Wie hängen Erwartungswert der Stichproben-Standardabweichung $E(S)$ und die Standardabweichung σ zusammen?

Aufgabe 2: Likelihoodfunktion

Sie machen eine Blitzumfrage in Ihrem Umfeld, ob jemand raucht oder nicht. Sie bekommen folgende Antworten: *Raucher, Nichtraucher, Raucher, Nichtraucher, Nichtraucher*. Fassen Sie die Blitzumfrage als einfache Zufallsstichprobe „mit Zurücklegen“ auf. Bestimmen Sie die Likelihoodfunktion $f(R, \bar{R}, R, \bar{R}, \bar{R}|p)$, wobei p der Anteil der Raucher ist.

Aufgabe 3: Likelihoodfunktion

Gegeben sei eine einfache Stichprobe X_1, \dots, X_n mit

$$(a) X_i \sim \text{Exp}(\lambda) \quad (b) X_i \sim P(\mu) \quad (c) X_i \sim B(1, p)$$

Geben Sie jeweils die Likelihoodfunktion $f(x_1, \dots, x_n|\vartheta)$ in kompakter Form an. Verwenden Sie falls möglich das Produktsymbol \prod und/oder Summensymbol \sum .

Aufgabe 4: Erwartungswert und Varianz von Stichprobenfunktionen

Leiten Sie für die einfache Stichprobe X_1, \dots, X_n mit $E(X_i) = \mu$ und $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ jeweils den Erwartungswert und die Varianz folgender Stichprobenfunktionen her:

$$(a) \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (b) Y = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}$$

Aufgabe 5: Fraktile

X_i (mit $i = 1, \dots, n$) seien unabhängige, jeweils $N(\mu, \sigma)$ -verteilte Zufallsvariable. Geben Sie für jede der folgenden Größen die Zahl $x_{0,95}$ an, die mit 5 % Wahrscheinlichkeit überschritten wird (zum Beispiel für (a): $P(x_{0,95} < A) = 0.05$).

$$(a) A = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^7 (X_i - \bar{X})^2$$

$$(b) B = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{137} (X_i - \bar{X})^2$$

$$(c) C = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{12} (X_i - \mu)^2$$

$$(d) D = \frac{\sum_{i=1}^{16} X_i - 16\mu}{4S} \quad (\text{mit } S^2: \text{Stichprobenvarianz von } X)$$

$$(e) E = \frac{\sum_{i=1}^{1600} X_i - 1600\mu}{40S}$$

$$(f) F = \sum_{i=1}^9 \frac{X_i - \mu}{3\sigma}$$

4 Lösungen

Lösung Aufgabe 1:

Lösung Aufgabe 2:

$$f(R, \bar{R}, R, \bar{R}, \bar{R}|p) = f(R) \cdot f(\bar{R}) \cdot f(R) \cdot f(\bar{R}) \cdot f(\bar{R}) = p^2(1-p)^3$$

Lösung Aufgabe 3:

$$(a) f(x_1, \dots, x_n | \lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} = \lambda^n e^{-\lambda n \bar{x}}$$

$$(b) f(x_1, \dots, x_n | \mu) = \frac{\mu^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\mu}}{\prod_{i=1}^n x_i!} = \frac{\mu^{n\bar{x}} e^{-n\mu}}{\prod_{i=1}^n x_i!}$$

$$(c) f(x_1, \dots, x_n | p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i} = p^{n\bar{x}} (1-p)^{n(1-\bar{x})}$$

Lösung Aufgabe 4:

(a)

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \frac{1}{n} \mu \sum_{i=1}^n 1 = \mu$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{n}{n^2} \sigma^2 = \frac{1}{n} \sigma^2$$

(b)

$$E(Y) = E\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}\right) = \frac{E(\bar{X}) - \mu}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{\mu - \mu}{\sigma} \sqrt{n} = 0$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}\right) = \frac{n}{\sigma^2} \text{Var}(\bar{X}) = \frac{n}{\sigma^2} \frac{\sigma^2}{n} = 1$$

Lösung Aufgabe 5:

$$(a) A \sim \chi^2(n-1) = \chi^2(6)$$

$$P(A < x_{0.95}) = F(x_{0.95}) = 0.95$$

Tabelle 1 im Skript: $x_{0.95} = 12.59$

(b) $B \sim \chi^2(n-1)$, $n > 30 \Rightarrow$ Näherung mit $\tilde{x}_{0,95}$ aus $N(0, 1)$ -Verteilung:

$$\tilde{x}_{0,95} = 1.64 + 0.01 \frac{0.95 - 0.9495}{0.9505 - 0.9495}$$

$$= 1.645$$

$$x_{0,95} = \frac{1}{2}(\tilde{x}_{0,95} + \sqrt{2 \cdot 136 - 1})^2$$

$$= 164$$

(c) $C \sim \chi^2(n) = \chi^2(12)$, $x_{0,95} = 21.03$

(d) $D \sim t(n-1) = t(15)$, $x_{0,95} = 1.753$

(e) $E \sim t(1599) \approx N(0, 1)$, $x_{0,95} = 1.645$,

(f) $F \sim N(0, 1)$, $x_{0,95} = 1.645$